TUBERCULOSE

INFORMAÇÃO E TRATAMENTO CURAM

GUIA ILUSTRADO SOBRE TUBERCULOSE PARA PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA DO SISTEMA PRISIONAL

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL

O QUE É TUBERCULOSE?

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível causada por uma bactéria (bacilo de Koch).



A bactéria atinge principalmente os pulmões. Entretanto, a doença pode afetar outros órgãos do corpo.

TUBERCULOSE NO BRASIL

Cerca de 78 mil novos casos por ano

Cerca de 4.500 mil mortes por ano

SINAN, 2018.

TUBERCULOSE NO SISTEMA PRISIONAL

Devido as suas condições de vida e de saúde, algumas pessoas apresentam maior risco* de desenvolver tuberculose. São as populações-chave:

INDÍGENAS

x3

PESSOAS COM HIV/AIDS

x25

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

x56

PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE

x28

*Dados da população geral.
Fonte: Sinan/MS e IBGE (2013), Sinan/MS, IBGE e DCCI (2017), Tbweb, SP, 2015 e Pessoa em Situação de Rua: Censo São Paulo, capital (2015) e Sinan/MS, IBGE e Infopen (2016).

TUBERCULOSE NO SISTEMA PRISIONAL

Em relação à população privada de liberdade, diversos fatores contribuem para o aumento do número de casos de tuberculose:

- Condições insalubres, como superlotação, falta de ventilação e iluminação solar reduzida.
- Falta de conhecimento em relação aos sinais e sintomas.
- Dificuldades de acesso ao serviço de saúde prisional.
- Medo de discriminação em caso de diagnóstico positivo.
- Detecção tardia de casos, realização do tratamento de forma irregular e abandono do tratamento.

Concentração:
No Brasil, as pessoas privadas de liberdade representam apenas 0,3% da população total do país. No entanto, 12% dos casos de tuberculose notificados têm origem no sistema prisional.

SINAN, 2018.

COMO SE PEGA TUBERCULOSE?

A TOSSE É A PRINCIPAL FORMA DE TRANSMISSÃO.

COMO SE PEGA TUBERCULOSE?

A TB também pode ser transmitida pelo espirro ou pela conversa.

O risco de transmissão da TB pela conversa é pequeno. Depende da duração da exposição e do ambiente em que as pessoas se encontram.

Após **15 dias** de tratamento, a pessoa **pode não transmitir mais a doença.**

Uma forma de diminuir a transmissão da tuberculose é a proteção da tosse. **Coloque o braço na frente da boca e do nariz ao tossir** e oriente todas as pessoas a fazerem o mesmo.

COMO NÃO SE PEGA TUBERCULOSE?

ABRAÇO



USAR OS MESMOS COPOS E TALHERES

USAR A MESMA CADEIRA, CANETA OU PAPEL.

PICADA DE MOSQUITO

Você não vai pegar tuberculose em qualquer simples contato físico que tenha com as pessoas privadas de liberdade. Mantenha seu ambiente de trabalho ventilado e facilite o acesso ao ambulatório para todas as pessoas privadas de liberdade que estão tossindo ou em tratamento de tuberculose.

O QUE AS PESSOAS SENTEM QUANDO ESTÃO COM TUBERCULOSE?

Se você estiver com esses sintomas, procure uma unidade de saúde para investigação. Se você perceber alguma pessoa privada de liberdade com esses sinais, facilite o acesso desta pessoa ao ambulatório de sua unidade prisional.

TRATAMENTO

A TB é uma doença curável, desde que o tratamento seja realizado até o final, sem interrupções. Por isso, diagnosticar e tratar de forma rápida e correta são as principais medidas para o controle da TB.

O tratamento é feito com remédios e dura, no mínimo, seis meses.

Os remédios devem ser ingeridos todos os dias sob o acompanhamento do profissional de saúde.



Mesmo que a pessoa se sinta melhor, deve continuar ingerindo os remédios até o final.

Se você sabe de uma pessoa privada de liberdade que está em tratamento, procure conversar com ela sobre a TB e a importância de continuar ingerindo os medicamentos até o fim do tratamento.

Com o tratamento correto, todos estão mais protegidos da tuberculose. Inclusive você!

EFEITOS COLATERAIS

Algumas pessoas, ao iniciarem o tratamento, podem ter alguns efeitos colaterais. Os mais comuns são:



Se você perceber essas reações em alguma pessoa privada de liberdade em tratamento, ajude-a a acessar o serviço de saúde. Isso é muito importante para que ela não interrompa o tratamento, diminuindo as chances de propagação da TB entre todos.

ABANDONO DO TRATAMENTO

A manutenção do tratamento é um dos principais desafios para o controle da TB no sistema prisional. Caso o tratamento seja interrompido, a pessoa pode:

Voltar a transmitir a doença

Desenvolver resistência ao tratamento, já que as bactérias se fortalecem





Ter seu tempo de tratamento aumentado

PERDA DOS MEDICAMENTOS:

Considerando a superlotação das celas e os procedimentos de revista é possível que as pessoas em tratamento percam seus medicamentos. Quando isso acontecer, facilite o acesso ao serviço de saúde: para obter a cura da tuberculose é importante que o tratamento seja ininterrupto.

TRATAMENTO EM LIBERDADE

Antes que a pessoa privada de liberdade seja liberada da unidade prisional, oriente-a a conversar com o profissional de saúde a respeito dos procedimentos necessários para a manutenção do tratamento fora do sistema prisional.

A pessoa que vai dar continuidade ao tratamento fora do sistema prisional precisa saber que:

- **é possível adquirir medicação em qualquer unidade de saúde.**
- **os familiares podem auxiliar no acesso à unidade de saúde.**

Em caso de transferência de unidade prisional, os setores de saúde devem se comunicar previamente, sempre que possível. O prontuário médico do paciente deve ser encaminhado à unidade de destino junto ao prontuário penal.

PARA VENCER A TUBERCULOSE

É PRECISO IR ATÉ O FIM DO TRATAMENTO.

TUBERCULOSE

INFORMAÇÃO E TRATAMENTO CURAM

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

Ministério da Saúde
FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz
Brasília

SUS

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA

PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL